

ESTADO ACTUAL

Desde diciembre de 2009 hasta la fecha, el Laboratorio Nacional de Referencia INEVH “Julio I. Maiztegui” ha confirmado la circulación de virus dengue serotipo 1 (DEN-1) en Argentina, en la localidad de Puerto Iguazú, Misiones.

Situación en Puerto Iguazú

Desde mediados de diciembre de 2009 se registra allí un brote de dengue.

En el transcurso del año 2010 se registraron hasta la fecha 247 casos¹. De estos, 50 fueron notificados al Sistema Nacional de Vigilancia Laboratorial. El resto fueron confirmados porque presentan síntomas clínicos compatibles con la enfermedad y son personas que residen en la zona con circulación viral comprobada, es decir que se consideran como “casos confirmados por nexos epidemiológico”.

En la zona de brote se siguen realizando acciones de control, a cargo de equipos técnicos y personal sanitario del municipio de Puerto Iguazú, de la provincia de Misiones y del Ministerio de Salud de la Nación. Éstas incluyen tareas de descacharrado, bloqueos de foco -fumigación en torno a las manzanas próximas al domicilio de las personas afectadas- y búsqueda de pacientes febriles con síntomas compatibles con dengue.

Situación en otras jurisdicciones

En el día de ayer (jueves 4 de febrero de 2010), se notificaron dos pacientes con diagnóstico de dengue², uno en Ciudad de Buenos Aires y otro en la ciudad de Rosario (Provincia de Santa Fe), ambos sin antecedente de viaje a zonas o países con circulación viral.

En la siguiente tabla se muestra la distribución de casos de dengue confirmados en la República Argentina, según provincia de residencia, informados por las Direcciones de Epidemiología Provinciales desde el **1º de enero al 4 de febrero de 2010**.

Provincia	Enfermos con dengue acumulados 2010	Casos de dengue notificados en la última semana	Serotipo aislado
Misiones*	247	67	DEN 1
Ciudad de Bs. As.*	1	1	No consigna
Santa Fe*	1	1	No consigna


¹ Fuente: Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones

² Fuente: Direcciones de Epidemiología Provinciales

Desde el **1º de enero al 2 de febrero de 2010**, 15 provincias han realizado estudios sobre pacientes febriles.

PROVINCIA RESIDENCIA	Pacientes estudiados	Pacientes en estudio correspondientes a la última semana
BUENOS AIRES	36	10
CAPITAL FEDERAL	16	5
CATAMARCA	21	10
CHACO	8	2
CORDOBA	34	8
CORRIENTES	1	1
ENTRE RIOS	8	1
FORMOSA	4	0
JUJUY	40	16
MISIONES	53	27
SALTA	49	11
SAN LUIS	1	0
SANTA FE	49	18
SGO. DEL ESTERO	2	0
TUCUMAN	2	2
Total Argentina	324	111

En el siguiente mapa se muestra la distribución de casos de dengue según localidad de residencia. **1º de enero de 2010 al 4 de febrero de 2010**. República Argentina.



Fuente:
 *Ministerio de Salud Provinciales
 **Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud – SNVS-SIVILA

NOTIFICACIÓN OFICIAL DE PAÍSES LIMÍTROFES

PAIS	LOCALIDAD	NÚMERO DE CASOS	SEROTIPO
PARAGUAY ³	CONCEPCION	131	
	MISIONES	3	
	PARAGUARI	6*	
	ALTO PARANÁ	28	
	CENTRAL	3**	DEN 1
	AMAMBAY	5	
	PRESIDENTE HAYES	29	
	ASUNCIÓN	3	
	Total	209	
	BOLIVIA ⁴	SANTA CRUZ	149
PANDO		137	
BENI		54	NO CONSIGNA
TARIJA		37	
CHUQUISACA		16	
LA PAZ		16	
COCHABAMBA		8	
Total	417**		
BRASIL ⁵	PARANÁ	893***	DEN1; DEN 2; DEN3

(*) Casos provenientes de Brasil

(**) Todos son casos clasificados como sospechosos, hasta la fecha no hay casos confirmados

(***) Casos correspondientes al año 2009. Todos tiene confirmación por laboratorio.

RECOMENDACIONES

Dada la actual situación epidemiológica y el particular desplazamiento de personas a causa de las vacaciones, el Ministerio de Salud de la Nación recomienda a todos los servicios y dependencias sanitarias del país, intensificar la detección precoz de personas con síntomas de dengue y comunicar a la población la importancia de la consulta temprana ante la aparición de síntomas compatibles en personas que hayan viajado recientemente a áreas con circulación viral.

Cuándo sospechar dengue: cuando la persona presenta **fiebre mayor a 38°C, sin signos de infección respiratoria** acompañada de dos o más de los siguientes síntomas: cefalea, anorexia, náuseas, erupciones cutáneas, dolor detrás de los ojos (retro-ocular), malestar general, dolor en los músculos y/o en las articulaciones, diarrea o vómitos.

Se recuerda que la transmisión de la enfermedad del humano al mosquito solo se produce en el período de fiebre. Por lo tanto se recomienda la protección individual de los pacientes (mientras dure la fiebre) a través del uso de repelentes, telas mosquiteras y tabletas o espirales.

³ Fuente: Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay, Dirección General de Vigilancia de la Salud, "Parte Semanal N° 8", 20/01/2010.

⁴ Fuente: República de Bolivia, Ministerio de Salud y Deportes. 02-02-2010 Disponible en <http://www.sns.gov.bo/snis/default.aspx>.

⁵ Fuente: ESTADO DO PARANÁ, Secretaria de Estado da Saúde – SESA Superintendência de Vigilância em Saúde, Departamento de Vigilância Ambiental, Divisão de Doenças Transmitidas por Vetores. 28-01-2010. Disponible en http://www.paranadengue.pr.gov.br/arquivos/File/BoletimDengue12_2009.pdf